

SKUTECZNE PRZECINANIE SZYI U DROBIU




Stowarzyszenie Humanitarnego Uboju (HSA)

Identyfikacja naczyń krwionośnych

Kurczak

Indyk



U tych ptaków nie wykonano przecięcia szyi, a jedynie rozcięcie w celu uwidocznienia nienaruszonych naczyń krwionośnych.

Żyły szyjne można łatwo zidentyfikować, ponieważ przebiegają tuż pod skórą.


Tętnice szyjne przebiegają w mięśniu szyjnym i są **najważniejszymi naczyniami krwionośnymi**, które trzeba przeciąć, ponieważ to one przenoszą utlenowaną krew do mózgu.

U kurczaków, gęsi i perliczek tętnice szyjne są zwykle widoczne na powierzchni mięśnia szyjnego w sąsiedztwie głowy.

U indyków i kaczek te tętnice są ukryte pod powierzchnią mięśnia i dlatego konieczne jest rozcięcie mięśnia, aby je wydobyć.

Zastosowanie

Głębokie poziome wcięcie do mięśnia szyi, w poprzek czoła i obu stron gardła, tuż pod kością szczękową, jest nazywane brzuszным przecięciem szyi (ang. ventral neck cut, VNC) i stanowi niezawodną metodę przecięcia **obu tętnic szyjnych wspólnych** i **obu żył szyjnych zewnętrznych** u wszystkich gatunków. VNC powoduje **szybkie** wykrwawienie się ptaków i dlatego jest korzystne dla samopoczucia zwierząt i jakości mięsa.



Ocena



Wypływająca krew **tętnicza** tworzy kształt odwróconej litery V.



Oznaki skutecznego cięcia

Bezpośrednio po wykonaniu cięcia, przez około 5-10 sekund **dwa wąskie „strumienie”** krwi powinny wytrysnąć pod dużym ciśnieniem w kształcie odwróconej litery V; wskazuje to, że **obie tętnice szyjne wspólne** zostały przecięte

- ▶ Ptak powinien się wykrwawiać przez co najmniej 2,25-3 minuty.
- ▶ Należy regularnie sprawdzać, czy ptak pozostaje nieprzytomny.
- ▶ Potwierdzić zgon (trwałe ustanie odruchu rogówkowego i rytmicznego oddychania) przed rozpoczęciem dalszej obróbki.



Oznaki nieskutecznego cięcia

Powolnie wypływająca lub kapiąca krew bezpośrednio po cięciu, nawet u drobnych gatunków (np. przepiórki), może wskazywać, że żyły zostały przecięte, ale tętnice mogą być nienaruszone. Natychmiast ponownie przeciąć szyję, aż wypłynie wystarczająca ilość krwi, lub odciąć głowę ptaka.

Uwaga: niektóre stany mogą obniżyć ciśnienie krwi ptaka (np. spowolnienie rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, dyslokacja szyi, ogłuszenie urządzeniem bólowe może powodować uszkodzenie naczyń krwionośnych w obrębie głowy), a wówczas „strumienie” krwi mogą się nie pojawić pomimo przecięcia obu tętnic.